

Hướng dẫn CLENPIQ®

Bác sĩ đã kê toa thuốc CLENPIQ Bowel Prep Kit cho cuộc nội soi sắp tới của quý vị. Quý vị có thể cảm thấy lo lắng một chút, nhưng đừng lo, hướng dẫn này sẽ giúp quý vị theo từng bước.

Xem video hướng dẫn trên trang web của chúng tôi.



Hướng dẫn dùng thuốc

Thuốc GLP-1 và phentermine

- Bảy (7) ngày trước ngày nội soi, cần ngừng thuốc chủ vận GLP-1 dạng uống và tiêm, phentermine và **tất cả** các loại thuốc giảm cân (Bydureon BCise® (exenatide), Byetta® (exenatide), Mounjaro® (tirzepatide), Ozempic® (semaglutide), Rybelsus® (semaglutide), Saxenda® (liraglutide), Trulicity® (dulaglutide), Victoza® (liraglutide), Wegovy® (semaglutide), Zepbound (tirzepatide), Adipex, Fastin®, Phentercot, Pro-Fast, Qsymia®).
- Ngừng bổ sung chất xơ và sắt, vitamin tổng hợp có chứa sắt và dầu cá liều cao.

Thuốc loãng máu

- Bác sĩ tiêu hóa sẽ tư vấn về việc có cần ngừng dùng thuốc loãng máu (thuốc chống đông máu và thuốc chống kết tập tiểu cầu) sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ đã kê toa cho quý vị.
- Nếu quý vị hiện đang dùng aspirin, quý vị có thể tiếp tục sử dụng.

Thuốc trị tiểu đường

- Trước ba (3) ngày, bệnh nhân tiểu đường không dùng thuốc SGLT2, chẳng hạn như JARDIANCE® (empagliflozin), INVOKANA® (canagliflozin), FARXIGA® (dapagliflozin), SYNJARDY® (empagliflozin/metformin) hoặc STEGLUJAN® (ertugliflozin/sitagliptin), v.v.

Hướng dẫn dùng chất lỏng trong suốt

- Để chuẩn bị làm sạch ruột thành công, điều quan trọng là quý vị phải **mu**a các sản phẩm chất lỏng trong suốt như chỉ định.
- Mua những sản phẩm để dùng theo chế độ chất lỏng trong suốt. Để thoải mái hơn, hãy mua thuốc mỡ chống hăm, loại giấy vệ sinh hai hoặc ba lớp mà quý vị thích và/hoặc khăn ướt có thể xả xuống bồn cầu.

Sản phẩm được phép dùng

- ✓ Nước
- ✓ Nước dùng trong suốt
- ✓ Cà phê/trà không có sữa hoặc kem
- ✓ Nước ép trong không có bã
- ✓ Gatorade®
- ✓ Jell-O®
- ✓ Pulp-free Popsicles®

Sản phẩm cần tránh

- ✗ Sữa
- ✗ Nước ép đỏ hoặc tím
- ✗ Mọi thứ có bã
- ✗ Rượu/bia
- ✗ Thức ăn dạng đặc

Ba ngày trước ngày nội soi

- Ngừng ăn rau sống hoặc rau có hạt, ngô/bắp, bông ngô, các loại hạt.

Hai ngày trước ngày nội soi

- Tiếp tục chế độ ăn ít chất xơ và tránh thực phẩm có chứa các loại hạt.

Dành cho bệnh nhân bị táo bón

Vui lòng làm theo hướng dẫn cho thuốc magnesium citrate. Vào buổi sáng, hãy bắt đầu dùng chất lỏng trong suốt và tránh thức ăn đặc cho đến sau nội soi. Vào lúc 6 giờ chiều, uống 10-ounce thuốc magnesium citrate. Quý vị có thể pha với Gatorade hoặc soda trong suốt để tạo hương vị. Nếu quý vị bị suy tim sung huyết hoặc suy thận đang chạy thận (lọc máu qua màng bụng hoặc chạy thận nhân tạo), không được uống và liên lạc với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa.

Một ngày trước ngày nội soi

- Trừ khi có chỉ dẫn khác, **quý vị hãy bắt đầu dùng chất lỏng trong suốt** vào buổi sáng và không ăn thức ăn đặc cho đến sau nội soi.
 - Thuốc CLENPIQ liều 1: Vào 6 giờ chiều, bắt đầu uống 1 chai thuốc CLENPIQ, uống trực tiếp từ chai. Không pha với bất kỳ chất lỏng nào khác.
 - Sau khi uống xong chai thuốc CLENPIQ, hãy uống ít nhất năm ly nước, mỗi ly 8-ounce trong năm tiếng tiếp theo. Quý vị sẽ nhanh chóng cảm thấy tác dụng của thuốc, vì vậy nên ở gần nhà vệ sinh.
 - Hướng dẫn dùng các loại thuốc khác vào buổi tối hôm trước
 - Bệnh nhân tiểu đường phụ thuộc insulin có thể tiếp tục dùng insulin khi cần, nhưng chỉ dùng một nửa liều thông thường và cần theo dõi chặt chẽ chỉ số đường huyết. Chuẩn bị sẵn các loại chất lỏng trong suốt có đường để dùng khi cần.
 - Bệnh nhân tiểu đường không phụ thuộc insulin, uống thuốc trị tiểu đường như bình thường.



Ngày nội soi

- Để tuân thủ yêu cầu về việc gây mê, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc lá hoặc cần sa nào vào ngày nội soi. Điều này bao gồm thuốc lá không khói, thuốc lá nhai, thuốc lá điện tử, vape, túi ZYN và các sản phẩm tương tự khác.

6 tiếng trước giờ nội soi



- Uống chai CLENPIQ còn lại, uống trực tiếp từ chai. Không pha với bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Sau khi uống xong thuốc CLENPIQ, uống ba ly nước, mỗi ly 8-ounce trong 1 tiếng tiếp theo.
- Quý vị phải hoàn thành toàn bộ quá trình súc ruột ngay cả khi ruột của quý vị đã sạch.
- Quý vị phải hoàn thành việc súc ruột 4 tiếng trước giờ nội soi.

Hướng dẫn dùng các loại thuốc khác vào ngày nội soi

- Bệnh nhân tiểu đường, hãy thực hiện theo các hướng dẫn dùng thuốc sau.
 - Bệnh nhân tiểu đường phụ thuộc insulin có thể dùng insulin nếu cần thiết, nhưng chỉ dùng **một nửa** liều thông thường và theo dõi chặt chẽ chỉ số đường huyết. Chuẩn bị sẵn các chất lỏng trong suốt có đường **nếu cần**, để điều chỉnh lượng đường trong máu. Không được uống bất kỳ thứ gì trong vòng 2 tiếng trước giờ nội soi.
 - Bệnh nhân tiểu đường không phụ thuộc insulin, **tạm dừng** uống thuốc tiểu đường dạng uống cho đến sau khi nội soi xong.
- Trừ khi bác sĩ đưa ra hướng dẫn khác, quý vị có thể uống (các) loại thuốc được kê toa theo bình thường với một ngụm nước nhỏ, ít nhất 2 tiếng trước khi giờ nội soi. Không uống bất kỳ thứ gì khác cho đến khi nội soi xong.
- Bệnh nhân hen suyễn, hãy mang theo ống hít đến buổi hẹn.
- Điều bắt buộc là quý vị phải uống tất cả thuốc chống co giật và thuốc huyết áp vào sáng ngày nội soi.

4 tiếng trước giờ nội soi

- Không ăn uống gì cho đến khi nội soi xong.
- Không nhai kẹo cao su hoặc ăn kẹo cứng.
- Quý vị có thể đánh răng nhưng không được nuốt.

Hướng dẫn thêm cho ngày nội soi

Vi nội soi yêu cầu dùng thuốc gây mê, nên quý vị cần có một tài xế (từ 18 tuổi trở lên) đi cùng đến cuộc hẹn. Tài xế phải có mặt và check-in cùng quý vị và ở lại trung tâm nội soi để có thể hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Nếu không có tài xế đi cùng, cuộc nội soi sẽ bị hủy bỏ. Quý vị không được về nhà bằng taxi, Uber hoặc Lyft hoặc phương tiện công cộng. Thuốc gây mê sẽ gây ảnh hưởng làm quý vị không thể lái xe an toàn hoặc làm việc vào ngày nội soi. Sau nội soi, quý vị không được lái xe, vận hành máy móc hạng nặng hoặc ký các văn bản pháp lý trong vòng 24 tiếng.



Thực hiện theo các hướng dẫn thêm từ bác sĩ của quý vị.
Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với Gifthealth.

Để biết thêm thông tin, hãy quét mã QR để xem các Câu hỏi thường gặp.

Cần thêm trợ giúp?

- Trò chuyện tại www.gifthealth.com
- 833.614.2051
- care@gifthealth.com